

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



Καρπόδεση – νεαρές ράγες σε
ανάπτυξη



Ράγες σε ανάπτυξη



Ράγες σε ανάπτυξη
(κατακόρυφη θέση
σταφυλιού)

Τα κύρια βλαστικά στάδια ποικιλίας σουλτανίνα που εμφανίζονται αυτή την περίοδο είναι:


- *Πρώιμες* περιοχές : ράγες σε ανάπτυξη
- *Μεσοπρώιμες* περιοχές : ράγες σε ανάπτυξη
- *Όψιμες* περιοχές : καρπόδεση – ράγες σε ανάπτυξη



Ευδεμίδα. Τέλειο έντομο.
Πεταλούδα περίπου 1εκ.



Ευδεμίδα. Προνύμφη
πολύ ευκίνητη, μέχρι 1εκ.
μήκος.



Ευδεμίδα. Αυγά σε νεαρές ράγες (αριστερά) ευδιάκριτα με γυμνό μάτι (μέγεθος πολύ μικρής φακής), και αυγά σε μεγέθυνση (στο κέντρο πρώτης μέρας πρόσφατα τοποθετημένο και δεξιά έτοιμο να εκκολαφθεί – ορατή η κουλουριασμένη προνύμφη με καστανό κεφάλι).



Ωίδιο. Μολύνσεις στο φύλλωμα



Ωίδιο. Σε νεαρές ράγες



Περνόςπορος. Κηλίδες λαδιού στην πάνω πλευρά και λευκό χνούδι (σπόρια) μόνο στην κάτω πλευρά με υψηλή βραδινή υγρασία



Περνόςπορος. Προσβολή στο σταφύλι. Μοιάζουν με «βρασμένα χόρτα», ξεραίνονται τμήματα ή και ολόκληρα σταφύλια παίρνοντας συχνά σχήμα S (δεξιά φωτογραφία)



Τζιτζικάκι. Ενήλικο (περωτό) έντομο. Είναι τα μεταναστευτικά άτομα του είδους.



Τζιτζικάκι. Προνύμφη του εντόμου. Δεν πετά, είναι στην κάτω πλευρά του φύλλου, βαδίζει με πλάγια κίνηση.



Τζιτζικάκι. Καρούλιασμα και μεταχρωματισμός σε φύλλα ποικιλίας σουλτανί. Στις ερυθρές ποικιλίες ο μεταχρωματισμός είναι κοκκινωπός.

<p>ΕΥΔΕΜΙΔΑ : (<i>Lobesia botrana</i>)</p> <p>Μεσοπρώιμες περιοχές ⇒</p> <p>Όψιμες περιοχές ⇒</p>	<p>-Στις μεσοπρώιμες περιοχές οι ωτοκίες πυκνώνουν. - Ενδεικτικές παρατηρήσεις σε αμπέλι μεσοπρώιμης ζώνης *: (10 αυγά ανά 100 σταφύλια στις 27 Μαΐου & 33 αυγά ανά 100 σταφύλια στις 30 Μαΐου). *Η παρατήρηση είναι ενδεικτική και δείχνει την τάση των πληθυσμών του εντόμου αυτήν την περίοδο.</p> <p>Συνιστάται <u>επαναληπτικός ψεκάσμος</u> στις μεσοπρώιμες περιοχές στις παρακάτω ημερομηνίες:</p> <p>Επιτραπέζια: 1 - 2 Ιουνίου Σουλτανί - οινοποιήσιμα: 4 - 5 Ιουνίου</p> <p>Η δεύτερη πτήση του εντόμου ξεκίνησε και στις όψιμες περιοχές και διαπιστώνονται οι πρώτες ωτοκίες. Συνιστάται <u>έναρξη αντιμετώπισης</u> στις όψιμες περιοχές το διάστημα:</p> <p>Επιτραπέζια: 1 - 2 Ιουνίου Σουλτανί - οινοποιήσιμα: 3 - 5 Ιουνίου</p> <p>Σημείωση: Για το νομό Χανίων θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.</p>
<p>ΩΙΔΙΟ : (<i>Erysiphe necator</i>)</p> <p>Συστάσεις:</p>	<p>Η ασθένεια εμφανίζεται στα περισσότερα αμπέλια. Να συνεχιστεί η προστασία. Τα βλαστικά στάδια που διανύουμε είναι ευαίσθητα στην ασθένεια.</p> <p>Συνιστάται να γίνεται εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την ορθή διαχείριση τυχόν ανθεκτικότητας. Το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης είναι πολύ αποτελεσματικό στις συνθήκες της εποχής (παρατεταμένη ηλιοφάνεια και χαμηλή υγρασία). <u>Προσοχή</u> στη χρήση του σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28°C) διότι παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά.</p>
<p>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ : (<i>Plasmopara viticola</i>)</p>	<p>Οι ξηροθερμικές συνθήκες που επικρατούν την περίοδο αυτή δεν ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Ανάγκη προστασίας την περίοδο αυτή έχουν αμπέλια με συμπτώματα που βρίσκονται σε θέσεις που σημειώνονται έντονες δροσιές.</p>
<p>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ : (<i>Empoasca spp</i>)</p>	<p>Παρατηρούνται προνύμφες σε αρκετά αμπέλια στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Να γίνεται έλεγχος στην κάτω επιφάνεια της ακραίας τρυφερής βλάστησης και όπου εντοπίζονται προνύμφες (άπτερα άτομα) μπορεί να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.</p>

Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών-ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η έγκριση του σκευάσματος **Pyrinex 25 CS** με δραστική ουσία **chlorpyrifos** τροποποιήθηκε και το σκεύασμα επιτρέπεται στο αμπέλι μέχρι πριν την άνθηση στα επιτραπέζια και μέχρι 20 ημέρες πριν τη συγκομιδή στα οινοποιήσιμα. Παρακαλούμε να επικαιροποιήσετε τη λίστα που σας έχουμε αποστείλει.